

VIGILANCE ANEMIE INFECTIEUSE DES EQUIDES
Suivi des foyers en Allemagne
en prévision de l'Euro-Paint de Kreuth du 23 au 29 aout 2015

Les informations officielles transmises par le Ministère de l'Agriculture (Dgal) concernant les foyers d'anémie infectieuse des équidés en Allemagne concordent avec les actualités diffusées sur le site internet d'Euro-Paint à la date du 9 aout 2015.

La Dgal a fait savoir en complément qu'un dernier foyer consécutif aux enquêtes en cours, notifié aux Etats Membres le 12 aout matin, a été mis en évidence à Schwandorf ; un cheval affecté a été euthanasié, 35 chevaux étaient présents dans l'installation, des contrôles des mouvements et des investigations sont toujours en cours.

Dans ce contexte, la Dgal, considère ne pas pouvoir garantir qu'il n'y ait pas de risque à faire circuler des équins dans le secteur mais ne doute pas du sérieux des autorités vétérinaires allemandes dans la gestion sanitaire des foyers.

L'Ifce et le Respe conseillent vivement aux propriétaires des équidés qui souhaitent participer à l'Euro-Paint d'appliquer des mesures préventives de désinsectisation des transports, hébergement et chevaux pour éloigner les insectes piqueurs potentiellement vecteurs du virus de l'anémie infectieuse.

Des produits insecticides, moustiquaires et pièges à insectes doivent être largement utilisés dans les camions et dans les boxes.

Quelques informations utiles concernant la maladie sont données en annexe de cet avis.

Pour toute information complémentaire contacter :

- contact@respe.net - 09.70.63.37.93
- benedicte.ferry@ifce.fr - 06.86.42.71.60



L'Anémie Infectieuse des Equidés en question

Qu'est-ce que l'Anémie Infectieuse des Equidés (A.I.E.) ?

L'Anémie infectieuse est une **maladie virale** dont les symptômes plus ou moins importants selon les périodes sont la **fièvre**, l'**anémie** et l'**amaigrissement**.

Le cheval atteint reste porteur du virus toute sa vie et donc réservoir permanent du virus, ce qui explique la sévérité des mesures réglementaires et notamment l'abattage.



C'est une **maladie vectorielle transmise par les taons** au cours de leurs repas successifs d'un cheval infecté à un cheval sain.


Le **dépistage** sérologique ou « **Test de Coggins** » est réalisé en quelques jours sur un prélèvement sanguin. **Ce test doit être réalisé au moins 35 jours après le contact jugé contaminant**, de manière à respecter le temps d'incubation (15 jours) et le temps d'apparition des anticorps dans le sang. **Le périmètre de sécurité pris en compte pour la transmission par les taons est de 2 km.**

Quelles sont les mesures de prévention de l'Anémie Infectieuse ?

La **désinsectisation** est un des moyens de prévention à privilégier du fait du mode de transmission de la maladie ; **désinsectisation individuelle et répétée par pulvérisation sur la robe du cheval et désinsectisation des bâtiments et des moyens de transports.**

Les regroupements de chevaux en saison chaude augmentent le risque de transmission et plus la densité des chevaux est élevée plus le risque augmente. **Éviter le rassemblement des chevaux autour des aires de douche qui attirent les taons.**

En cas d'apparition sur un cheval de signes d'abattement ou de fièvre, l'isoler aussitôt en le plaçant hors de portée des taons (désinsectisation individuelle et moustiquaire sur les ouvertures du boxe ou de l'abri) **et appeler un vétérinaire.**



Le virus se transmettant par voie sanguine, il ne faut pas négliger l'importance de l'**utilisation du matériel injectable à usage unique** et de la désinfection avec un produit virucide des matériels dentaires ou vétérinaires.

Pour toute information complémentaire contacter :

- contact@respe.net - 09.70.63.37.93
- benedicte.ferry@ifce.fr - 06.86.42.71.60

*if*ce

institut français
du **cheval**
et de l'**équitation**



Pour toute information complémentaire contacter :

- contact@respe.net - 09.70.63.37.93
- benedicte.ferry@ifce.fr - 06.86.42.71.60